


アコアラン[®] 静注用

溶解方法と適用上の注意

■ 溶解方法



溶解液注入針（連結針）の片側のキャップをはずす。

添付の溶解液のバイアルゴム栓の中央に連結針を深く刺入する。注1)

連結針のもう一方のキャップをはずし、アコアランのバイアルゴム栓の中央に深く刺入する。注2)

溶解液が上になるように逆転する。液が流れ始めたら液ができるだけアコアランのバイアルの壁面に沿って流れ込むように傾ける。注3)

溶解液の空バイアルは連結針と共に抜き去る。

注 1) 連結針は必ず先に溶解液のバイアルに刺入してください。

注 2) 連結針はゴム栓の中央(図の●内)にまっすぐに刺入してください。

【●内の外に刺入したり、斜めに刺入するとゴム栓がバイアル内に脱落する場合があります。】

注 3) 本剤に溶解液全量を加えた後、静かに円を描くように回して溶解してください(強く振らないでください)。

■ 適用上の注意

【調製時】

- ・調製前に本剤及び添付溶解液を室温に戻しておいてください。
- ・添付の溶解液を用いて溶解してください。
- ・原則として、他剤との混合注射は避けてください。
- ・溶解後はできるだけ速やかに使用してください。
- ・使用後の残液は細菌汚染のおそれがあるので使用しないでください。

【投与時】

- ・沈殿の認められるもの又は混濁しているものは投与しないでください。
- ・溶解した液をシリコンオイルが塗布されているシリンジで採取した場合、浮遊物が発生することがあります。投与前に浮遊物がないか目視で確認してください。浮遊物が認められた場合には投与しないでください。